



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



Il fumo in Italia

SINTESI DEI RISULTATI

Indagine effettuata per conto de
l'Istituto Superiore di Sanità,
in collaborazione con
l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

maggio 2005
S. 05503/4

Per incarico dell'Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la DOXA ha effettuato anche quest'anno un'indagine campionaria volta a rilevare:

- **la prevalenza dei fumatori** sulla popolazione italiana adulta
- **alcune abitudini dei fumatori** (consumo giornaliero, tentativi di smettere, luoghi d'acquisto, spesa media settimanale, ecc.)
- **le opinioni degli italiani (fumatori e non) su alcuni argomenti legati al fumo** (i recenti divieti, il ruolo del medico di base, l'impatto delle scritte sui pacchetti, fumo e guida, misure di disassuefazione, ecc.).

I principali risultati vengono presentati mettendoli a confronto con quelli rilevati, con la stessa metodologia, nelle edizioni precedenti dell'indagine (2001, 2002, 2003 e 2004).

Per questa indagine sono state condotte **3.114** interviste ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre.

La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da **137** intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **15 marzo - 30 aprile 2005** in **149** comuni di tutte le regioni italiane.

	Totale	Sesso	
		Maschi	Femmine
<i>Base:</i>	(3.114)	(1.511)	(1.603)
Mai fumatori	55,8	45,5	65,5
Ex-fumatori	18,6	25,2	12,4
Fumatori correnti di sigarette	25,6	29,3	22,1
di cui:			
- meno di 15 sigarette/die	12,3	11,0	13,4
- 15-24 sigarette/die	10,9	14,4	7,6
- 25 sigarette o più/die	2,4	3,9	1,1



